



## مفاغره سينية مستقيمية

اقرأ بعناية المعلومات الواردة في الكتيب لأن عدم الاستعداد يمكن أن يجعل الفحص غير قابل للإجراء.

### ما هي المفاغرة السينية المستقيمية؟

المفاغرة السينية المستقيمية هو فحص المستقيم والجزء السفلي من القولون. يتم إدخال أنبوب مرن عبر المستقيم. قد يُظهر الشخص تغييرات في المنطقة أو إزالة أورام (من حجم) أصغر أو لحميات في الغشاء المخاطي.

### استعدادات للفحص

ينبغي لك أن تكثر من شرب السوائل يوم قبل الفحص وتجنب خبز القمح الكامل (خبز أسمر)، بذور الكتان، والنوى البصغيرة للفواكه والتوت في الخمس الأيام الأخيرة قبل الفحص.

نزود □ بحقنة شرجية عندما تصل إلى مختبر الجهاز الهضمي بحيث يتم إفراغ الجزء السفلي من الأمعاء ويصبح بالإمكان رؤية الأغشية المخاطية للأمعاء بأفضل طريقة ممكنة.

### الأدوية وغيرها من الأمراض

يجب عليك أن تحبطينا علماً بالأدوية التي تشكل لك حساسية والتي لا يمكنك تناولها، وأعلى □نا كذلك في حالة وجود □راض □ مثل الذبحة الصدرية، وفشل القلب، واضطرابات نزيف دم، لأن هذا قد يؤثر على اختيار الإجراء.

### تنطبق الاحتياطات التالية على الأدوية التي تؤثر على فترة النزيف

#### الأدوية التي تؤثر على فترة النزيف:

- إذا كنت تستخدم ألبيل - Albyl-E، فيمكنك الاستمرار في ذلك حتى يوم الاختبار إذا لم تتلق أي تعليمات أخرى.
- إذا كنت تستخدم بلافيكس Plavix / بريليك Brilique / إيفيننت Efient، فعليك الاتصال بنا قبل الإجراء.
- إذا كنت تستخدم غزارلطو Xarelto / إيليكس Eliquis / برادكسا Pradaxa، قم بإيقافه قبل الإجراء بي □ين.
- إذا كنت تستخدم مريفان Marevan، فعليك إيقافه 3 أيام قبل الإجراء ويجب فحص تخثر الدم (INR) في □ختبرنا. لذا يجب عليك الحضور على الأقل ساعة قبل الاختبار وإخبارهم بذلك عند توجيهك لمنصة الاستعدادات للعيادة الطبية الخارجية.
- إذا كنت خضعت لعملية صمام قلب □يكانيكي، فعليك الاتصال مقدماً بعيادة الطبية الخارجية لتخطيط تغيير دواء مارفان Marevan وتعويضه بدواء فراغمين Fragmin.

## الفحص ذاته

يستغرق الفحص تقريباً 15-30 دقيقة. قد تشعر بألم غاز مزعج أثناء الفحص.

## بعد الفحص

سيتم إبلاغ الطبيب الذي أحالك بنتائج الفحص بعد 1-2 أسبوعين. وإذا تم أخذ عينات من الأنسجة، فيحصل الطبيب الذي أحالك على النتائج بعد 4-6 أسابيع.

## مضاعفات؟

تتأراً ما تقع مضاعفات المفاغرة السينية المستقيمية، عند أخذ عينات أنسجة أو إزالة لحميات يحدث جرح صغير في الغشاء المخاطي. تتأراً ما يحدث نزيف، ولكن قد يحدث ذلك 3-4 أيام بعد الفحص. ويتوقف عنآة لحاله.

إذا اصابتك كوك بحدوث تلف في جدار الأمعاء، اتصل بطبيبك أو طبيب الحراسة بالعيآة الطبية هنا في المستشفى، اتصل على +45 22 23 00 50

لا يقوم طبيب المستشفى بتحرير الإجازة المرضية على يوم الفحص، ولكن يمكنك الحصول على تصريح بأنك حضرت لهذا الفحص.