

HF	Lovisenberg Diakonale Sykehus											
Spesialitet	Nyresykdommer – Del 2 Fagspesifikk generell utdanningsplan											
LIS 2/3	LIS 2						LIS 3					
Tid	0-0,5 år	0,5-1 år	1-1,5 år	1,5-2 år	2-2,5 år	2,5-3 år	3-3,5 år	3,5-4 år	4-4,5 år	4,5 – 5 år	5-5,5 år	5,5-6 år
Rotasjon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HF	LDS	LDS	LDS	LDS	LDS	LDS	LDS	LDS	LDS	HSØ	HSØ	HSØ
Læringsarena	?	?	?	?	?	?	Nyremed	Nyremed	Nyremed	Nyremed Ahus/Ullevål/RH		
Læringsmål FIM/INF	FIM?	FIM	FIM	FIM	FIM	FIM	NYR 1-17, 20, 22-34, 36, 45-49, 52-56 og 58- 62			NYR 18,19,21, 35, 37- 44, 50-51 og 57		
Læringsmål FKM												

Beskrivelse av læringsarenaer i nyresykdommer:

Nyremedisinsk seksjon ved LDS er organisert som egen enhet under Medisinsk klinikk ved LDS. Dialyseenheten og poliklinikken er samlokalisert i lyse, nyoppussede lokaler. Dermed er det lav terskel for kontinuerlig supervisjon og møtepunkter ila dagen. Vi har hemodialyseseksjon, peritoneal dialyse og poliklinisk virksomhet, samt tilsyn på Medisinsk intensiv og overvåkning (MIO) og sengepost på pasienter med nyremedisinske problemstillinger. Det er til enhver tid én overlege tilknyttet hver av disse seksjonene og LIS-legen vil rotere mellom seksjonene der det alltid vil være en overlege til stede for supervisjon. LIS 3 roterer ila utdanningsforløpet mellom de ulike seksjonene og deltar i virksomhet på sengepost, ved hemo- og peritoneal dialyse og poliklinikken. Herav tilegner de seg kunnskap om et bredt spekter av nyrelidelser, forebygging, diagnostikk og behandling. Det er et krav om 12 mnd. dialysetjeneste før rotasjon sentralt, og dette vil kombineres med poliklinisk virksomhet. Ved poliklinisk tjeneste er det avsatt tid til diskusjon og gjennomgang av kasus med overlege. I vaksammenheng er det spesialist i mottak til stede på dag og kveld for supervisjon og vurdering av pasienter, samt tilstedeværende nefrolog 3 kvelder per uke og tilgjengelig på telefon igjennom hele døgnet. Det er lite teknisk utstyr som er nødvendig for Nyremedisin, men vi har digitalt overvåkningssystem for hemodialysebehandling og nytt ultralydapparat for vurdering av fistler og adominalprobe.